

A KAKO VI ŠTITITE SVOJE DIJETE?



+ ZAŠTITNO CIJEPLJENJE PROTIV PNEUMOKOKA

AUT-PRV03-0308

Ne gubite vrijeme – zaštitite svoje dijete – i cijepte ga još u dojenačkoj dobi protiv pneumokoka!
Detaljnije informacije možete saznati na stranici www.oesterreichischerpatient.at
te na broj **01/403 28 91**

ZAŠTITITE SVOJE DIJETE!

ZAŠTITNO CIJEPLJENJE
PROTIV PNEUMOKOKA



Ovu informaciju vezanu za temu pneumokoka posvećuje vam

Wyeth

A baby with brown hair is looking upwards with a curious expression. The background is a light blue gradient. Scattered around the baby are several blue, spherical molecular models, some of which are larger and more prominent than others. The models consist of small spheres connected by thin lines, representing complex biological structures.

? ŠTO SU PNEUMOKOKI?

Pneumokoki su bakterije koje mogu izazvati čitav niz oboljenja, posebice kod dojenčadi i male djece. Osim teških, po život opasnih bolesti pneumokoki mogu prouzročiti i lakša oboljenja, kao što su npr. upale srednjeg uha.

? ZAŠTO SU PNEUMOKOKI OPASNI?

Pneumokoki mogu izazvati čitav niz teških infekcija kao što je upala moždanih ovojnica, upala pluća i otrovanje krvi. Posebno opasno oboljenje je upala moždanih ovojnica (vidi sljedeću stranicu), koja i uz optimalno liječenje može dovesti do dugotrajnih oštećenja ili smrti.

? ZAŠTO SU UPRAVO MALA DJECA POSEBNO UGROŽENA?

U dojenačkoj dobi nestaje imunološka zaštita koju je dojenče dobilo od majke tijekom trudnoće. Vlastiti imunosni sustav dojenčeta i malog djeteta ipak još nije u stanju stvoriti odgovarajuću otpornost na pneumokoke.

? ŠTO JE UPALA MOŽDANIH OVOJNICA?

Upala moždanih ovojnica je teška infekcija središnjeg živčanog sustava koja se za samo nekoliko sati može pretvoriti u po život opasnu kliničku sliku bolesti. Oboljenje se upravo u početnom stadiju jedva može razlikovati od neke banalne infekcije. Zbog vrlo brzog tijeka rano prepoznavanje je često teško moguće, a i kod pravodobne terapije otprilike svaki deseti oboljeli umire. Dugotrajna oštećenja javljaju se kod jedne trećine do jedne četvrtine pacijenata. Moguće dugotrajne posljedice su paraliza, gluhoća, epilepsija, poremećaji u razvoju i druga oštećenja.

? KAKO MOGU ZAŠTITITI SVOJE DIJETE OD OBOLJENJA IZAZVANOG PNEUMOKOKOM?

Obzirom da pneumokoki permanentno cirkuliraju u populaciji, svoje dijete ne možete zaštititi od kontakta s pneumokokima. Zaštitno cijepljenje protiv pneumokoka može pružiti zaštitu od pneumokoknih infekcija.

? JE LI ZAŠTITNO CIJEPLJENJE PROTIV PNEUMOKOKA PREPORUČLJIVO ZA MOJE DIJETE?

Cijepljenjem možete zaštititi svoje dijete od teških pneumokoknih infekcija. Ove su bolesti rijetke, ali za vaše dijete mogu značiti doživotna oštećenja ili čak smrt. Iz tog razloga se u Austrijskom planu cijepljenja zaštitno cijepljenje protiv pneumokoka preporučuje za svu djecu do 5 godina. Za takozvanu „rizičnu djecu“ u Austriji troškovi cijepljenja idu na teret fonda.

? ŠTO SU „RIZIČNA DJECA“?

Pod „rizičnom djecom“ podrazumijevamo npr. nedonoščađ (trajanje trudnoće do 36 tjedana plus 6 dana) i djecu male porođajne težine (ispod 2.500 g). Osim toga, kao rizična djeca također se definiraju dojenčad i djeca s poremećajem napredovanja, s urođenim ili stečenim imunološkim defektima te djeca s kroničnim bolestima. Za dodatne informacije ili pitanja kontaktirajte svog liječnika.

? KOLIKO DOBRO DJELUJE ZAŠTITNO CIJEPLJENJE PROTIV PNEUMOKOKA?

Cijepljenje je dokazalo svoju djelotvornost u širokim kliničkim studijama i u praktičnoj primjeni. U SAD-u se cijepljenje od 2000. godine koristi na širokom uzorku, što je dovelo do drastičnog smanjenja teških pneumokoknih oboljenja.

? KADA TREBAM DATI CIJEPI TI DIJETE PROTIV PNEUMOKOKA?

Pneumokokno zaštitno cjepivo daje se obično istodobno s dojenačkim cjepivima u 3., 4. i 5. mjesecu života te u 2. godini života.

Ako se s cijepljenjem započne kasnije, mijenja se shema cijepljenja koju možete vidjeti u niže prikazanoj tablici.

Djetetova dob kod prvog cijepljenja	Shema cijepljenja
2–6 mjeseci	3 cijepljenja s najmanje 1 mjesecom razmaka; 4. cijepljenje u 2. godini života
7–11 mjeseci	2 cijepljenja s najmanje 1 mjesecom razmaka; 3. cijepljenje u 2. godini života
12–23 mjeseca	2 cijepljenja s najmanje 2 mjeseca razmaka
24 mjeseca–5 godina	1 cijepljenje

Za dodatne informacije ili pitanja kontaktirajte svog liječnika ili ljekarnika i informirajte se na stranici www.impfwelt.at!

? KOLIKO SE DOBRO PODNOSI CJEPIVO?

Pneumokokno zaštitno cjepivo je dobro ispitano cjepivo. Ozbiljne nuspojave u normalnom slučaju ne treba očekivati. Povremeno se mogu pojaviti nuspojave kao što su lagani otok i crvenilo na mjestu uboda. Ako imate dodatnih pitanja u vezi s time, obratite se svom liječniku.

Iskoristite priliku i cijeprite svoje dijete.

